

# XVI

## BOMBYLIIDAE (DIPTERA)

PAR

A. COLLART (Bruxelles)

---

9<sup>e</sup> CROISIÈRE

Le matériel rassemblé par M. W. ADAM au cours de son voyage ne renferme qu'un seul Bombyliide.

### **Bombylius nigrilobus** BEZZI, 1924

Afrique occidentale : Conakry (côte), 20.XI.1935, n° 34.

Il s'agit d'une femelle de 4,8 mm., un peu frottée, ce qui a fait disparaître en partie certaines marques caractéristiques du thorax et de l'abdomen; en l'occurrence, des touffes de poils argentés. La longueur du proboscis, mesurée à partir de l'extrême base de l'organe, est de 3,3 mm.; BEZZI donne 2,9-3,1 mm. pour les spécimens typiques. Pour le reste, l'exemplaire examiné correspond bien à la description de l'auteur <sup>(1)</sup>.

*B. nigrilobus* serait exclusivement une forme de l'Afrique occidentale, parfois confondue avec *B. ornatus* Wiedemann, comme l'a fait d'ailleurs jadis BEZZI, à propos d'un *Bombylius* recueilli par le Prof<sup>r</sup> SILVESTRI, en septembre 1912, à Dakar (Sénégal) <sup>(2)</sup>.

Les spécimens typiques provenaient de la Nigérie.

*Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.*

---

<sup>(1)</sup> BEZZI, M., 1924, *The Bombyliidae of the Ethiopian Region*. (Brit. Mus. [Nat. Hist.], pp. 40-41.)

<sup>(2)</sup> IDEM, *Ditteri raccolti dal Prof. F. Silvestri durante il suo viaggio in Africa del 1912-1913*. (Boll. Lab. Zool. Portici, VIII, p. 285.)

---

